

Probabilità totale



Richiamo la roulette

La roulette

L'organizzatore del gioco (il Banco) fa girare la pallina, che si ferma in una delle 37 vaschette segnate con i numeri da 0 a 36.

Prima che la pallina cominci a girare, ogni giocatore scommette sul numero che uscirà.

Molte scommesse sono possibili, ad esempio:

- 'indovinare' il numero che uscirà;
- 'indovinare' che uscirà un numero dispari;
- 'indovinare' che uscirà un numero rosso.

		0				
PASSE		1	2	3	MANQUE	
		4	5	6		
		7	8	9		
		10	11	12		
PAIR		13	14	15	IMPAIR	
		16	17	18		
		19	20	21		
		22	23	24		
◆		25	26	27	◆	
		28	29	30		
		31	32	33		
		34	35	36		
12 ^P	12 ^M				12 ^D	12 ^M



La roulette

Il ruolo dello zero

		0		
	1	2	3	
	4	5	6	
	7	8	9	
	10	11	12	
PASSE	13	14	15	MANQUE
	16	17	18	
PAIR	19	20	21	IMPAIR
	22	23	24	
	25	26	27	
	28	29	30	
	31	32	33	
	34	35	36	
12 ^P	12 ^M	12 ^D		12 ^D
				12 ^M
				12 ^P

Se esce zero, tutti i giocatori perdono, con una sola eccezione: il giocatore che ha scommesso sull'uscita del numero zero vince, come quando scommette su un altro qualsiasi numero.



Scommetto su due eventi

Punto un gettone su nero e un gettone su pari.

Ora debbo pensare a due eventi
'Esce un numero nero', 'Esce un numero pari'.

			0			
PASSE			1	2	3	MANQUE
			4	5	6	
			7	8	9	
			10	11	12	
PAIR 			13	14	15	IMPAIR
			16	17	18	
			19	20	21	
			22	23	24	
 12 ^P 12 ^M 12 ^D			25	26	27	 12 ^D 12 ^M 12 ^P
			28	29	30	
			31	32	33	
			34	35	36	


Come posso valutare la
probabilità di vincere in questa
nuova situazione?

Esamino casi possibili e casi favorevoli

Ecco come potrei ragionare:

- i casi possibili sono i 37 numeri della roulette;
- fra i 37 numeri ne trovo 18 neri e 18 pari, perciò i casi favorevoli sono $18 + 18 = 36$;
- la probabilità di vincita è

$$p = \frac{36}{37} \cong 0,973$$



La probabilità è molto vicina ad 1.
Ho ragionato bene?
Sono quasi sicuro di vincere?

Conto meglio i numeri favorevoli


			0					
PASSE			1	2	3	MANQUE		
			4	5	6			
			7	8	9			
			10	11	12			
 PAIR			13	14	15	IMPAIR		
			16	17	18			
			19	20	21			
			22	23	24			
 			25	26	27			
			28	29	30			
			31	32	33			
			34	35	36			
12 ^P	12 ^M	12 ^D				12 ^D	12 ^M	12 ^P



Ho trovato l'errore:

ho contato due volte i 10 numeri neri e pari, una volta nell'insieme A dei numeri neri e un'altra volta nell'insieme B dei numeri pari.

Conto meglio i numeri favorevoli



Ecco una frase e una figura che descrivono in modo corretto i numeri favorevoli alla mia vincita:

sono i numeri neri o pari

dove **o** è **inclusivo**, come il **vel** latino, cioè **include** i numeri che sono solo neri, solo pari, ma anche neri **e** pari, **contati però una sola volta**.

Valuto la probabilità

Ecco allora come valuto le probabilità che mi interessano

Evento	Numero di alternative	Numero di casi favorevoli	Probabilità
Esce uno dei 18 numeri neri	37	18	$q = \frac{18}{37}$
Esce uno dei 18 numeri pari	37	18	$r = \frac{18}{37}$
Esce uno dei 10 numeri neri e pari	37	10	$s = \frac{10}{37}$
Esce un numero nero o pari	37	$18 + 18 - 10$	$p = \frac{18 + 18 - 10}{37} = \frac{26}{37}$

Così la probabilità p che esca un numero nero o pari è

$$p = \frac{26}{37} \cong 0,703$$


Valutare la probabilità

Osservo che risulta:

$$p = \frac{18 + 18 - 10}{37} = \frac{18}{37} + \frac{18}{37} - \frac{10}{37}$$

Così scrivo la probabilità p in altra forma


Evento	Numero di alternative	Numero di casi favorevoli	Probabilità
Esce uno dei 18 numeri neri	37	18	$q = \frac{18}{37}$
Esce uno dei 18 numeri pari	37	18	$r = \frac{18}{37}$
Esce uno dei 10 numeri neri e pari	37	10	$s = \frac{10}{37}$
Esce un numero nero o pari	37	$18 + 18 - 10$	$p = \frac{18}{37} + \frac{18}{37} - \frac{10}{37}$


$$p = q + r - s$$

Il linguaggio degli insiemi e della probabilità

			0					
PASSE			1	2	3	MANQUE		
			4	5	6			
			7	8	9			
			10	11	12			
 PAIR			13	14	15	IMPAIR		
			16	17	18			
			19	20	21			
			22	23	24			
			25	26	27			
			28	29	30			
			31	32	33			
			34	35	36			
12 ^P	12 ^M	12 ^D				12 ^D	12 ^M	12 ^P

Evento	Probabilità
A esce un numero nero	$P(A) = \frac{18}{37}$
B esce un numero pari	$P(B) = \frac{18}{37}$
$A \cap B$ Esce un numero nero e pari	$P(A \cap B) = \frac{10}{37}$
$A \cup B$ Esce un numero nero o pari	$P(A \cup B) = \frac{18}{37} + \frac{18}{37} - \frac{10}{37}$



Valuto la **probabilità totale**
che si verifichi **A o B**

La probabilità totale di due eventi

Posso ripetere lo stesso procedimento per risolvere tutti i problemi descritti qui sotto.

Due eventi A, B

Evento	Probabilità
A	$P(A)$
B	$P(B)$
$A \cap B$	$P(A \cap B)$
$A \cup B$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Valuto la **probabilità totale** che si verifichi A $\circ$ B ($\circ$ inclusivo)

Attività

Completa la scheda di lavoro per riflettere sulla probabilità totale

Riflessioni sulle risposte date

Primo problema

*Estrai una carta da un mazzo di carte napoletane ben mischiate.
Valuta la probabilità di estrarre una figura o una carta di bastoni*



Due procedimenti per risolvere il problema

Calcola la probabilità p di estrarre una figura o una carta di bastoni


Procedimento 1

Osservo il disegno degli insiemi e conto:

Qual è il numero N di casi possibili?

Qual è il numero F di casi favorevoli?

Qual è la probabilità p ?



Due procedimenti per risolvere il problema


Valuta la probabilità p di estrarre una figura o una carta di bastoni

Procedimento 1

Osservo il disegno gli insiemi e conto:

Qual è il numero N di casi possibili? **$N = 40$**

Qual è il numero F di casi favorevoli? **$F = 19$**




$$p = \frac{19}{40} = 0,475$$

Due procedimenti per risolvere un problema

Valuta la probabilità di estrarre una figura o una carta di bastoni

Procedimento 2.
Applico la probabilità totale

Evento	Probabilità
A Estraggo una carta di bastoni	$P(A) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0,25$
B Estraggo una figura	$P(B) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3$
$A \cap B$ Estraggo una figura di bastoni	$P(A \cap B) = \frac{3}{40} = 0,075$
$A \cup B$ Estraggo una figura o una carta di bastoni	$P(A \cup B) = \frac{10}{40} + \frac{12}{40} - \frac{3}{40} = \frac{19}{40} = 0,475$



Secondo problema

2. Una scuola di 1000 studenti organizza alla fine dell'anno un'indagine sull'efficacia di un corso opzionale di inglese; la tabella sotto elenca gli esiti dell'indagine.

Uno studente della scuola viene estratto a sorte per partecipare a un viaggio in Inghilterra.

Voto in inglese	Partecipazione al corso		TOTALI
	no	si	
Voto ≤ 6	200	75	275
Voto > 6	225	500	725
TOTALI	425	575	1000

Valuta la probabilità p di estrarre uno studente che ha un voto maggiore di 6 in inglese o ha partecipato al corso opzionale.

Due procedimenti per risolvere il problema

Valuta la probabilità p di estrarre uno studente che ha un voto maggiore di 6 in inglese o ha partecipato al corso opzionale.

Procedimento 1

Osservo la tabella e conto:

Qual è il numero N di casi possibili?

Qual è il numero F di casi favorevoli?

Qual è la probabilità p ?

Voto in inglese	Partecipazione al corso		TOTALI
	no	si	
Voto ≤ 6	200	75	275
Voto > 6	225	500	725
TOTALI	425	575	1000

Due procedimenti per risolvere il problema

Valuta la probabilità p di estrarre uno studente che ha un voto maggiore di 6 in inglese o ha partecipato al corso opzionale.

Procedimento 1

Osservo la tabella e conto:

Qual è il numero N di casi possibili? $N = 1000$

Qual è il numero F di casi favorevoli? $F = 725 + 75 = 795$

Qual è la probabilità p ?

$$p = \frac{795}{1000} = 0,795$$

Voto in inglese	Partecipazione al corso		TOTALI
	no	si	
Voto ≤ 6	200	75	275
Voto > 6	225	500	725
TOTALI	425	575	1000

Secondo problema

Applico la probabilità totale

	Partecipazione al corso		
Voto in inglese	no	si	TOTALI
Voto ≤ 6	200	75	275
Voto > 6	225	500	725
TOTALI	425	575	1000

A : estraggo studente con voto maggiore di 6.	$P(A) = \frac{725}{1000} = 0,725$
B : estraggo studente che ha partecipato al corso	$P(B) = \frac{575}{1000} = 0,575$
$A \cap B$: estraggo studente con voto > 6 e che ha partecipato a corso	$P(A \cap B) = \frac{500}{1000} = 0,500$
$A \cup B$: estraggo studente con voto > 6 e che ha partecipato a corso	$P(A \cup B) = 0,725 + 0,575 - 0,500 = 0,795$

Calcoli con le probabilità

Per scrivere una probabilità posso scegliere fra:

- una frazione;**
- un numero decimale;**
- una percentuale.**

Finora abbiamo lavorato molto spesso con le frazioni.

Che cosa cambia lavorando con i numeri decimali?

Riprendo due problemi per riflettere

Confronto calcoli con le probabilità

1. Valuto la probabilità di estrarre una figura **o** una carta di bastoni

Evento	Probabilità con frazioni	Probabilità con decimali
A Estraggo una carta di bastoni	$P(A) = \frac{10}{40} = 0,25$	$P(A) = 0,25$
B Estraggo una figura	$P(B) = \frac{12}{40} = 0,3$	$P(B) = 0,3$
$A \cap B$ Estraggo una figura di bastoni	$P(A \cap B) = \frac{3}{40} = 0,075$	$P(A \cap B) = 0,075$
$A \cup B$ Estraggo una figura o una carta di bastoni	$P(A \cup B) = \frac{10}{40} + \frac{12}{40} - \frac{3}{40} = \frac{19}{40}$	$P(A \cup B) = 0,25 + 0,3 - 0,075 = 0,475$

$$\frac{10}{40} = 0,25$$

$$\frac{12}{40} = 0,3$$

$$\frac{19}{40} = 0,475$$

Denominatore $40 = 2^3 \times 5$,
composto solo con 2 e 5.

Numeri decimali
finiti, scritti con
tutte le loro cifre

Confronto calcoli con le probabilità

2. Alla roulette valuto la probabilità che esca nero o pari

Evento	Probabilità con frazioni	Probabilità con decimali
A Esce un numero nero	$P(A) = \frac{18}{37} \cong 0,49$	$P(A) \cong 0,49$
B Esce un numero pari	$P(B) = \frac{18}{37} \cong 0,49$	$P(B) \cong 0,49$
$A \cap B$ Esce un numero nero e pari	$P(A \cap B) = \frac{10}{37} \cong 0,27$	$P(A \cap B) \cong 0,27$
$A \cup B$ Esce un numero nero o pari	$P(A \cup B) = \frac{18}{37} + \frac{18}{37} - \frac{10}{37} = \frac{26}{37}$	$P(A \cup B) \cong 0,49 + 0,49 - 0,27 = 0,71$

$$\frac{18}{37} \cong 0,49$$

$$\frac{10}{37} \cong 0,27$$

$$\frac{26}{37} \cong 0,70$$

Denominatore 37, **NON**
composto con 2 o 5.

Numeri decimali con infinite cifre,
arrotondati con due cifre dopo la virgola

Confronto calcoli con le probabilità

La soluzione dei problemi porta a richiamare che:

- i calcoli con le frazioni conducono sempre a risultati esatti;
- se ‘traduco’ le frazioni in numeri decimali trovo le due situazioni illustrate qui sotto.

Situazioni	Numero decimale	Risultato dei calcoli con i decimali
A. Ogni frazione ha il denominatore composto solo con i numeri 2 o 5.	Ha un numero finito di cifre dopo la virgola.	Esatto, se svolgo i calcoli con tutte le cifre dopo la virgola.
B. Tutti gli altri casi	Il numero decimale viene arrotondato	Approssimato